

Flowchart injectie vaccin uit AMPUL

INSTITUUT VOOR
PERMANENTE STUDIE
VOOR APOTHEKERS

IPSA

CONTROLEER:

identiteit,
indicatie,
type vaccin,
dosis,
vervaldatum,
injectieplaats,
bewaring vaccin
(koude keten)

BEVRAAG:

Allergie & actieve infectie

Zwangerschap,
stollingsproblemen,
anticoagulantia,
immuundeficiëntie
(chemo)



1

Ontsmet je handen

Verzamel de
benodigdheden binnen
handbereik op een
zuiver werkvlak



2

Verwijder vloeistof
uit de kop en hals
van de ampul (door op
de kop te tikken)



3

Houd een depper rond
de hals van de ampul
en breek voorzichtig af
(duim op breekvlak)



4

Open verpakking van
optreksnaald en 1ml spuit


Zet aanzetstuk
aseptisch op de spuit



5

Haal capsule van
de naald en neem
de ampul vast in
de andere hand

Plaats punt van de
naald in de ampul
zonder rand te raken
en trek de vloeistof op



6

Haal de naald uit de
flacon

Zuig extra lucht aan
zodat optreksnaald
leeg is

Open injectienaald
23-25G / 25 mm



7

Verwijder de optrek-
naald (naaldcontainer)
en plaats injectienaald
op de spuit.

Verwijder zichtbare
luchtballen uit spuit
ZONDER verlies
van vloeistof.

Controleer volume en
leg op werkoppervlak.



8

Installeer de patiënt
in een comfortabele
zithouding

Ontsmet je handen
opnieuw



9

Bepaal locatie:
m **deltoidaeus**
(3-4 vingers onder
acromion, lateraal
bovenarm)

Alternatief bij CI:
m vastus lateralis
Quadriceps



10

Was prikzone indien
bevuild

Span de huid wat op

Naald in hoek van 90°
ca. 2/3e inbrengen in
vlotte beweging
(bij zware personen
naald volledig!)



11

Trage injectie
(1 sec per 0,1ml)
+ vlot uithalen naald

Licht masseren met
niet steriele depper
+ pleister

15-20 min observatie

registratie vaccinatie