

Tableau récapitulatif

	<b>Comirnaty® Pediatric (Pfizer)</b>	<b>Comirnaty Original/Omicron BA.4- 5 (Pfizer)</b>	<b>Comirnaty xbb1.5. (Pfizer)</b>
ARNm	Roxtozinameran 10µg/0,3mL	Tozinameran/Famtozinam eran 15µg-15µg/0,3mL	Roxtozinameran 30µg/0,3mL
1 ou 2 doses pour la vaccination de base	1	2	1
À utiliser à partir de	5 – 11j	12 ans et plus	12 ans et plus
Vaccination de base**	0.3 mL	0.3 mL	0.3 mL
Vaccination de rappel (Booster)	/	0,3 mL	0.3 mL
Intervalle entre 2 doses pour la vaccination de base	/	Min. 21 jours	/
Intervalle entre 2 doses pour la dose de rappel ( <i>booster</i> )	Min. 3 mois – Idéalement 6 mois	Min. 3 mois – Idéalement 6 mois	Min. 3 mois – Idéalement 6 mois

\* RTU : Ready to use/ Prêt à l'emploi, flacon multidose. Ne doit pas être dilué

	<b>Comirnaty® Pediatric (Pfizer)</b>	<b>Comirnaty® Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer)</b>	<b>Comirnaty xbb1.5. (Pfizer)</b>
Stockage	-80°C (12 mois)	-80°C (12 mois)	-80°C (12 mois)
Nombre minimum de doses/flacon	6 (7)	6 (7)	6 (7)
Durée de conservation (2°-8°C)	10 semaines	10 semaines	10 semaines
Durée de conservation (<25°C) avant de percer le flacon	24 h	12h	24 h
Durée de conservation (<25°C) après avoir percé le flacon *	6h	6h	6h
Transport en seringues	Autorisé	Autorisé	Autorisé
Durée de conservation maximale des seringues préparées* (<25°C et à l'abri de la lumière)	6h	6h	6h

**\*Pour des raisons microbiologiques plutôt que pour des raisons de stabilité (= 12 h)**

UNE FOIS DÉCONGELÉ, NE PAS RECONGELER. NE PAS REMETTRE UN FLACON OUVERT DANS LE RÉFRIGÉRATEUR

UNE DURÉE DE CONSERVATION MAXIMALE DE LA SERINGUE PRÉPARÉE EST INDIQUÉE, MAIS ADMINISTREZ-LES DÈS QUE POSSIBLE, DE PRÉFÉRENCE DANS LES 2 HEURES !

SOYEZ ATTENTIF AUX CONDITIONS DE TEMPÉRATURE DANS LESQUELLES LE VACCIN EST STOCKÉ ET PRÉPARÉ. SURTOUT SI AUCUNE CLIMATISATION N'EST PRÉVUE..