

# Flowchart anafylaxie na vaccinatie

INSTITUUT VOOR  
PERMANENTE STUDIE  
VOOR APOTHEKERS

**IPSA**

**ERNSTIGE ANAFYLAXIE IS EEN LEVENSBEDREIGENDE URGENTIE EN VEREIST ONMIDDELLIJKE INTRAMUSCULAIRE TOEDIENING VAN ADRENALINE!**

## MILDE REACTIE

- + Wegdrukbare rode plekken (urticaria) op het lichaam
- + Zwelling van gezicht of ogen
- + Misselijkheid


### BELEID

- 1 Bel 112 🚑
- 2 Lokaliseer EpiPen® of adrenaline Kit, maar **dien nog niet toe** 🪡
- 3 Leg patiënt plat op de grond en **observeer** ❤️



## ERNSTIGE REACTIE

- + Moeilijke en/of piepende **ademhaling**
- + **Zwellen van tong of keel**
- + Moeilijke spraak, hese stem
- + **Persisterende** duizeligheid, **bewusteloosheid**, niet voelbare pols
- + Ernstige buikkrampen, meermaals **braken**



**Urticaria of zwelling van het gelaat kunnen in ernstige reacties afwezig zijn door te lage bloeddruk!**

### BELEID

- 1 Leg patiënt op de grond (of zittend indien ademhaling moeilijk) 🪑
- 2 **Controleer ademhaling, teken van leven -> BLS protocol** zo nodig (+ 0,5 mg adrenaline IM of epipen® indien je met 2 bent, **COMPRESSIES PRIMEREN**)
- 3 **LEVEND: epipen® of 0,5 mg adrenaline IM in vastus lateralis van dijbeen** 🪡
- 4 Bel 112 🚑
- 5 Observeer ❤️ (+ stabiele zijlig indien bewusteloos)
- 6 Herhaal na 5 minuten adrenaline toediening indien geen beterschap 🪡

Bij **TWIJFEL**  
anafylaxie of syncope:  
**GEEF ADRENALINE IM**

**INDIEN ADEM OF  
HARTSTILSTAND:  
BLS PROTOCOL**  
+ 0,5 mg adrenaline IM  
indien 2 zorgverleners

### DOSIS ADRENALINE:

Kinderen 1-5 jaar..... 0,15 mg.... (0,15ml van 1 mg/ml ampul)  
Kinderen 6-12 jaar..... 0,3 mg.... (0,3 ml van 1 mg/ml ampul)  
> 12 j en volwassenen..... 0,5 mg.... (0,5 ml van 1 mg/ml ampul)

### EPIPEN® MET 300MCG ADRENALINE

is toegelaten bij personen vanaf > 20 kg (6 jaar).  
Bij 7-20 kg bevat de adrenaline auto-injector  
150 mcg

Liefst  
tegelijk