

Paxlovid®

Prévention d'infection grave par le SARS-CoV-2 (COVID-19)

Qu'est-ce que cela signifie et quand le médecin prescrit-il Paxlovid®?

Le SARS-CoV-2 (Coronavirus 2) est le virus à l'origine de la maladie COVID-19. Le virus s'installe principalement au niveau des voies respiratoires, provoquant une détresse respiratoire sévère. Les patients présentant un risque de COVID-19 grave peuvent se voir prescrire un médicament antiviral, le Paxlovid®, qui réduit le risque d'hospitalisation en inhibant la multiplication du virus dans le corps.


Efficacité

Paxlovid® doit être administré le plus tôt possible après le diagnostic et dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes pour avoir les meilleures chances de réussite.

Traitement

Paxlovid® ne doit être prescrit que par des médecins spécialisés qui traitent des patients dont le système immunitaire est fragile à la suite d'une maladie ou d'un traitement. Il se compose de 2 substances, le nirmatrelvir et le ritonavir. Le nirmatrelvir (comprimé rose, PF-07321332) bloque la multiplication du virus. Le ritonavir (comprimé blanc) permet au nirmatrelvir de rester actif plus longtemps ainsi que le traitement sera plus efficace.

Les deux substances, qui se présentent sous forme de comprimés séparés dans la boîte, doivent être pris ensemble.



Le Paxlovid® est commandé par le pharmacien à domicile. Il peut trouver plus d'information sur le site <https://kce.fgov.be/nl/paxlovid-nirmatrelvirritonavir>. Les commandes passées avant 14 heures sont livrées plus rapidement.

i Pour des informations supplémentaires, lisez aussi la notice !

Mode de prise

(1 ou) 2 comprimés de nirmatrelvir + 1 comprimé de ritonavir 2x/jour, AVEC ou SANS nourriture, pendant 5 jours

Le nombre de comprimés de nirmatrelvir dépendra de votre fonction rénale. On vous prescrira l'un des régimes suivants:

Plan de prise **normal**

	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5
Heure 0 (p.ex. 8h)	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖
12 heures plus tard (p.ex. 20h)	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖
⊖ = 150 mg nirmatrelvir			⊖ = 100 mg ritonavir		

Plan de prise **ajusté**

	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5
Heure 0 (p.ex. 8h)	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖
12 heures plus tard (p.ex. 20h)	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖

i Utilisez toujours ce médicament suivant les indications de votre médecin !

Attention

- Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau. Ne pas mâcher, casser ou écraser les comprimés.

- Si vous constatez que vous avez oublié de prendre le médicament ne prenez jamais une double dose à la prochaine prise. Si vous constatez l'oubli:

- dans les 8 heures qui suivent l'heure normale: prenez les comprimés oubliés normalement.
- avec plus que 8 heures de retard: prenez la dose normale comme prévu à la prochaine prise.

- Même si vos symptômes s'aggravent, il est recommandé de suivre le cours complet de 5 jours. Emportez vos médicaments à l'hôpital si vous devez être admis.

- Si la dose ajustée vous a été prescrite en cas de fonction rénale réduite, il vous sera demandé de retourner les comprimés de nirmatrelvir restants à la pharmacie à la fin du traitement.

- Ce traitement n'est pas recommandé chez les enfants, les femmes fertiles qui ne prennent pas de contraception, les femmes enceintes ou allaitantes.

i **Si vous avez d'autres questions, demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin !**

Effets secondaires

Les effets secondaires qui peuvent survenir sont: altération du goût, nausées, vomissements, diarrhée. Ces effets secondaires ne sont pas rares et ne constituent pas une raison immédiate de s'inquiéter ou d'interrompre le traitement.

Paxlovid® et les autres médicaments ?

Il est important de mentionner tout autre médicament que vous prenez: le médecin prescripteur verra alors si Paxlovid® peut être associé à celui-ci. Votre médecin sera informé de ce traitement et adaptera votre traitement à domicile si nécessaire. Si vous avez d'autres questions, votre pharmacien de référence et votre médecin généraliste peuvent vous aider.

i **Demandez toujours conseil à votre médecin et/ou votre pharmacien avant d'utiliser un autre médicament même si celui-ci peut être obtenu sans prescription !**

