

1ère Dose d'un vaccin ARNm

QUESTION		ACTION, , si la réponse est « oui »
1	Avez-vous déjà été vacciné(e) contre le covid-19?	Suivez l'anamnèse pour la 2 ^e dose
2	Vous sentez-vous malade aujourd'hui (fièvre, maux de gorge, toux, difficultés respiratoires, perte d'odorat...)?	Ne vaccinez pas. Attendez 15 jours après le rétablissement.
3	Avez-vous été testé(e) positif(-ve) au COVID-19 au cours de ces 15 derniers jours?	Reportez la vaccination jusqu'à au moins 15 jours après le dernier symptôme ou le test positif sans symptômes.
4	Avez-vous une tendance allergique ? - Avez-vous déjà eu une réaction allergique grave à un médicament ou à un vaccin ? - Êtes-vous allergique au PEG (polyéthylène glycol)? - Avez-vous déjà fait une anaphylaxie (= réaction allergique grave mettant la vie en danger) ? - Avez-vous déjà eu un oedème de Quincke (= gonflement de la gorge, de la langue) ? - Souffrez-vous de mastocytose systémique ou d'angioedème héréditaire ?	Ne vaccinez pas. Renvoyez vers un médecin.
5	Avez-vous de l'asthme ? Si oui, présentez-vous encore régulièrement des symptômes malgré votre traitement ?	Si les symptômes de l'asthme sont bien contrôlés, il n'y a pas de contre-indication. Sinon, renvoyez vers un médecin.
6	Avez-vous reçu un autre vaccin récemment ?	Un vaccin COVID ainsi qu'un vaccin grippe peut être administré en même temps que d'autres vaccins, à condition que ce soit sur des sites différents (ex : 2 bras différents).
7	Les ganglions sous vos aisselles ont-ils été enlevés (par exemple, parce que vous avez eu un cancer du sein) ? Si oui, de quel côté ?	Résection à gauche : vaccination du côté droit. Résection à droite : vaccination du côté gauche. Résection des deux côtés : vaccination dans le muscle antérolatéral de la cuisse.
8.	Êtes-vous sous thérapie anticoagulation ?	Comprimez pendant 2 min pour éviter le saignement
9	Avez-vous d'autres questions ?	Informez sur : - les effets indésirables du vaccin (le paracétamol est autorisé mais pas en prévention !) Il est normale d'avoir du mal dans le bras, si, par contre vous ressentiez aussi une oppression de la poitrine ou une difficulté à respiratoire, contactez votre médecin (myocarditis/pericarditis). - Expliquez le temps d'attente de 15 minutes.

Influenza et dose de booster après le vaccin ARNm

QUESTION		ACTION, , si la réponse est « oui »
1	Avez-vous déjà été vacciné(e) contre le covid-19?	Suivez l'anamnèse pour la 2 ^e dose, sauf si la vaccination de base a été faite avec un vaccin qui ne contient pas d'ARNm (Vaxsevria® Astrazeneca – Jcovden® J&J)
2	Vous sentez-vous malade aujourd'hui (fièvre, maux de gorge, toux, difficultés respiratoires, perte d'odorat...) ?	Ne vaccinez pas. Attendez 15 jours après le rétablissement.
3	Avez-vous été testé(e) positif(-ve) au COVID-19 au cours de ces 15 derniers jours?	Reportez la vaccination jusqu'à au moins 15 jours après le dernier symptôme ou le test positif sans symptômes.
4	Avez-vous eu une réaction allergique grave à votre premier vaccin contre le covid-19 et avez-vous eu besoin de soins médicaux ? Êtes-vous allergique au polysorbate (vaccin grippe)	Ne vaccinez pas. Renvoyez vers un médecin. NB : une allergie aux œufs n'est pas une contre-indication pour les vaccins influenza
5	Avez-vous de l'asthme ? Si oui, présentez-vous encore régulièrement des symptômes malgré votre traitement ?	Si les symptômes de l'asthme sont bien contrôlés, il n'y a pas de contre-indication. Sinon, renvoyez vers un médecin.
6	Avez-vous reçu un autre vaccin récemment ?	Un vaccin COVID ainsi qu'un vaccin grippe peut être administré en même temps que d'autres vaccins, à condition que ce soit sur des sites différents (ex : 2 bras différents).
7	Les ganglions sous vos aisselles ont-ils été enlevés (par exemple, parce que vous avez eu un cancer du sein) ? Si oui, de quel côté ?	Réséction à gauche : vaccination du côté droit. Réséction à droite : vaccination du côté gauche. Réséction des deux côtés : vaccination dans le muscle antérolatéral de la cuisse.
8.	Êtes-vous sous thérapie anticoagulation ?	Comprimez pendant 2 min pour éviter le saignement
9	Avez-vous d'autres questions ?	Informez sur : - les effets indésirables du vaccin (le paracétamol est autorisé mais pas en prévention !) Il est normale d'avoir du mal dans le bras, si, par contre vous ressentiez aussi une oppression de la poitrine ou une difficulté à respiratoire, contactez votre médecin (myocarditis/pericarditis). - Expliquez le temps d'attente de 15 minutes.

L'intervalle minimale pour une dose de rappel est 3 mois, idéalement 6 mois

Influenza enfants <9ans et primovaccination => 2ieme dose après aux moins 4 semaines