



Anamnese

Influenza vaccin



VRAAG	ACTIE, indien "ja" beantwoord
1. Voel je je vandaag ziek? Koorts, keelpijn, hoesten, moeilijk ademen ?	Niet vaccineren. Uitstel tot 14d na herstel.
2. Heb je de voorbije 14 dagen positief getest voor corona?	Uitstel tot minstens 14d na de laatste symptomen of na de positieve test indien asymptomatisch.
3. Heb je aanleg voor allergie? - Heb je ooit een erge allergische reactie gehad op een geneesmiddel of vaccin? - Heb je ooit een anafylactische shock of een ernstige levensbedreigende allergische reactie gehad? - Heb je een quincke oedeem (een zwelling in de keel en tong) gehad? - Heb je systemische mastocytose of erfelijk angio-oedeem? - Ben je allergisch voor polysorbaat?	Niet vaccineren Doorverwijzen naar de arts  NB: allergie voor eieren is geen contra indicatie voor influenza vaccin
4. Heb je astma? Zo ja, heb je regelmatig last van symptomen, ook al neem je je medicatie?	Als de astmasymptomen onder controle zijn, is er géén contra-indicatie. Indien niet, doorverwijzen naar de arts
5. Zijn de klieren in je oksels verwijderd, bijvoorbeeld omdat je borstkanker had? Aan welke kant?	Links verwijderd: rechts vaccineren Rechts verwijderd: links vaccineren Beide verwijderd: vaccineren in anterolaterale spier van de dij.
6. Neemt u bloedverduunners (andere dan ASA)	Druk 2 minuten op de injectieplaats om bloeding te stoppen
7. Heb je nog vragen?	Informeer over bijwerkingen. Paracetamol mag (maar niet preventief) Leg uit waarom 15 minuten wachttijd belangrijk zijn.

Bij kinderen, jonger dan 9 jaar die nog niet eerder werden gevaccineerd voor influenza: tweede dosis na minimaal 4 weken



Indien de anamnese het toelaat, mag je het vaccin toedienen.

