

Paxlovid®

Preventie van een ernstige infectie met SARS-CoV-2 (COVID-19)

Wat betekent het en wanneer schrijft de arts dit voor?

SARS-CoV-2 is het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Het virus nestelt zich voornamelijk in de luchtwegen, waardoor ernstige ademhalingsklachten kunnen ontstaan. Bij patiënten met een verhoogd risico op ernstige COVID-19 kan Paxlovid® gebruikt worden. Dit geneesmiddel vermindert de kans op een ziekenhuisopname door de vermenigvuldiging van het virus in het lichaam te remmen.


Doeltreffendheid

Paxlovid® moet zo snel mogelijk na de diagnose en binnen 5 dagen na het begin van de symptomen worden toegediend om de meeste kans op succes te hebben.

De behandeling

Paxlovid® mag alleen voorgeschreven worden door gespecialiseerde artsen die patiënten behandelen met een kwetsbaar immuunsysteem als gevolg van een ziekte of behandeling. Er zijn 2 bestanddelen, nirmatrelvir en ritonavir. Nirmatrelvir (roze tablet, PF-07321332) blokkeert de vermenigvuldiging van het virus. Ritonavir (witte tablet) zorgt ervoor dat nirmatrelvir langer kan werken.

Beide bestanddelen, die als afzonderlijke tabletten in de doos zitten, moeten samen worden ingenomen. Een correcte inname is belangrijk om de werkzaamheid te garanderen.



Paxlovid® wordt besteld door de huisapotheker. De arts bezorgt je een elektronisch voorschrift. Meer informatie kan de apotheker vinden op <https://kce.fgov.be/nl/paxlovid-nirmatrelvirritonavir>. Bestellingen die vóór 14u geplaatst worden, worden sneller geleverd.

i Lees voor meer informatie ook steeds de bijsluiter!

Wijze van inname:

**(1 of) 2 tabletten nirmatrelvir
+ 1 tablet ritonavir
2x/dag, MET of ZONDER VOEDSEL,
gedurende 5 dagen**

Het aantal tabletten nirmatrelvir (PF-07321332) is afhankelijk van je nierfunctie. Eén van volgende schema's zal voorgeschreven worden:

Standaardschema

	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
Tijdstip 0 (vb. 8u)					
12 uur later (vb. 20u)					
= 150 mg nirmatrelvir	= 100 mg ritonavir				

Aangepast schema

	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
Tijdstip 0 (vb. 8u)					
12 uur later (vb. 20u)					

i Gebruik dit geneesmiddel steeds zoals voorgeschreven door je arts!

Waarschuwingen

- Slik de tabletten in hun geheel in, met een glas water. De tabletten niet kauwen, breken of pletten.
- Neem geen dubbele dosis in. Als je vaststelt dat je een inname vergeten bent:
 - binnen de 8 uur na het normale tijdstip: neem de tabletten alsnog in.
 - langer dan 8 uur na het normale tijdstip: sla de inname over en wacht op het volgende innametijdstip.
- Als je de aangepaste dosis voor een verminderde nierfunctie kreeg voorgeschreven, wordt gevraagd de resterende tabletten nirmatrelvir terug te brengen naar de apotheek na afloop van de behandeling.
- Ook als je klachten verergeren, wordt aanbevolen de volledige 5-daagse kuur af te maken. Neem je medicatie mee naar het ziekenhuis als een opname toch nodig blijkt.
- Deze behandeling wordt niet aanbevolen bij kinderen, vruchtbare vrouwen die geen anticonceptie nemen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.


 **Indien je nog vragen hebt, raadpleeg je apotheek of arts!**

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen die zouden kunnen optreden zijn de volgende: veranderde smaak, misselijkheid, braken, diarree. Deze bijwerkingen zijn niet ongewoon en vormen geen directe reden tot ongerustheid of staken van de behandeling.

Wat met andere geneesmiddelen?

Het is belangrijk alle andere medicatie die u neemt te vermelden: de voorschrijvende arts zal dan nakijken of Paxlovid® hiermee kan gecombineerd worden. Uw huisarts zal op de hoogte gesteld worden van deze behandeling en uw thuismedicatie eventueel aanpassen. Indien u hier verder nog vragen over heeft, dan kunnen uw huisapotheker en huisarts u hierbij verder helpen.

 **Vraag steeds raad aan je arts of apotheker wanneer je andere geneesmiddelen moet gebruiken. Ook voor geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift nodig is!**

