




Anamnese

1e dosis mRNA vaccin



VRAAG		ACTIE, indien "ja" beantwoord
1.	Bent u al gevaccineerd tegen COVID-19?	Volg anamnese voor dosis 2
2.	Voel je je vandaag ziek? Koorts, keelpijn, hoesten, moeilijk ademen, niet goed ruiken?	Niet vaccineren. Uitstel tot 14d na herstel. 
3.	Heb je de voorbije 14 dagen positief getest voor corona?	Uitstel tot minstens 14d na de laatste symptomen of na de positieve test indien asymptomatisch.
4.	Heb je aanleg voor allergie? <ul style="list-style-type: none"> - Ben je allergisch voor polyethyleenglycol (Comirnaty)? - Heb je ooit een erge allergische reactie gehad op een geneesmiddel of vaccin? - Heb je ooit een anafylactische shock of een ernstige levensbedreigende allergische reactie gehad? - Heb je ook een quincke oedeem, een zwelling in de keel en tong, gehad? - Heb je systemische mastocytose of erfelijk angio-oedeem? 	Niet vaccineren Doorverwijzen naar de arts 
5.	Heb je astma? Zo ja, heb je regelmatig last van symptomen, ook al neem je medicatie?	Als de astmasymptomen onder controle zijn, is er géén contra-indicatie. Indien niet, doorverwijzen naar de arts
6.	Kreeg u recent een ander vaccin?	Zowel influenza als COVID-19 vaccin mogen tegelijkertijd met andere vaccins geplaatst worden, zolang dit op verschillende plaatsen gebeurt.
7.	Zijn de klieren in je oksels verwijderd, bijvoorbeeld omdat je borstkanker had? Aan welke kant?	Links verwijderd: rechts vaccineren Rechts verwijderd: links vaccineren Beide verwijderd: vaccineren in anterolaterale dijspier
8.	Neemt u bloedverduunners (andere dan ASA)	Druk 2 minuten op de injectieplaats om bloeding te stoppen
9.	Heb je nog vragen?	Informeer over bijwerkingen. Paracetamol mag Het is normaal om pijn te hebben in de arm. Ben je echter ook een beklemd gevoel op de borst, ben je snel kortademig, contacteer dan jouw arts (myocarditis/pericarditis) Leg uit waarom 15 minuten wachttijd belangrijk zijn.





Indien de anamnese het toelaat, mag je het vaccin toedienen.

Anamnese



Influenza en booster mRNA Covidvaccin

VRAAG		ACTIE, indien "ja" beantwoord
1.	Bent u al gevaccineerd tegen COVID-19 of griep?	→ Controleer merk & minimuminterval (zie onderaan de tabel). → Basisvaccinatie met Vaxzevria® (AZ) of JCOvden® (J&J): volg anamnese dosis 1(vorige blz.).
2.	Voel je je vandaag ziek? Koorts, keelpijn, hoesten, moeilijk ademen, niet goed ruiken?	Niet vaccineren. Uitstel tot 14d na herstel. 
3.	Heb je de voorbije 14 dagen positief getest voor corona?	Uitstel tot minstens 14d na de laatste symptomen of na de positieve test indien asymptomatisch.
4.	Heb je een erge allergische reactie gehad bij een eerdere dosis van het vaccin en had je medische hulp nodig? Ben je allergisch voor polysorbaat (griepvaccin)?	Niet vaccineren  Doorverwijzen naar de arts NB: allergie voor eieren is geen contra indicatie voor influenza vaccin
5.	Heb je astma? Zo ja, heb je regelmatig last van symptomen, ook al neem je je medicatie?	Als de astmasymptomen onder controle zijn, is er géén contra-indicatie. Indien niet, doorverwijzen naar de arts
6.	Kreeg u recent een ander vaccin?	Zowel influenza als COVID-19 vaccin mogen tegelijkertijd met andere vaccins geplaatst worden, zolang dit op verschillende plaatsen gebeurt.
7.	Zijn de klieren in je oksels verwijderd, bijvoorbeeld omdat je borstkanker had? Aan welke kant?	Links verwijderd: rechts vaccineren Rechts verwijderd: links vaccineren Beide verwijderd: vaccineren in anterolaterale spier van de dij.
8.	Neemt u bloedverduunners (andere dan ASA)	Druk 2 minuten op de injectieplaats om bloeding te stoppen
9.	Heb je nog vragen?	Informeer over merk vaccin & bijwerkingen. Paracetamol mag Het is normaal om pijn te hebben in de arm. heb je echter ook een beklemd gevoel op de borst, ben je snel kortademig, contacteer dan jouw arts (myocarditis/pericarditis) Leg uit waarom 15 minuten wachttijd belangrijk zijn.

Het minimuminterval voor een COVIDboosterdosis is minimaal 3 maand, idialiter 6 maand.

Bij kinderen, jonger dan 9 jaar die nog niet eerder werden gevaccineerd voor influenza: tweede dosis na minimaal 4 weken

