


ANAMNESE

Vaccin Influenza



QUESTION		ACTION, si la réponse est « oui »
1.	Vous sentez-vous malade aujourd'hui (fièvre, maux de gorge, toux, difficultés respiratoires...)?	Ne vaccinez pas. Attendez 15 jours après le rétablissement.
2.	Avez-vous été testé(e) positif(-ve) à la COVID-19 au cours de ces 15 derniers jours?	Reportez la vaccination jusqu'au moins 15 jours après le dernier symptôme ou le test positif sans symptôme.
3.	Avez-vous une tendance allergique ? - Avez-vous déjà fait une réaction allergique grave à un médicament ou à un vaccin ? - Avez-vous déjà fait une anaphylaxie (= réaction allergique grave mettant la vie en danger) ? - Avez-vous déjà eu un œdème de Quincke (= gonflement de la gorge, de la langue) ? - Souffrez-vous de mastocytose systémique ou d'angioœdème héréditaire ? - Êtes-vous allergique au polysorbate ?	Ne vaccinez pas. Renvoyez vers un médecin.  NB : une allergie aux œufs n'est pas une contre-indication pour les vaccins influenza.
4.	Avez-vous de l'asthme ? Si oui, présentez-vous encore régulièrement des symptômes malgré votre traitement ?	Si les symptômes de l'asthme sont bien contrôlés, il n'y a pas de contre-indication. Sinon, renvoyez vers un médecin.
5.	Les ganglions sous vos aisselles ont-ils été enlevés (par exemple, à la suite d'un cancer du sein) ? Si oui, de quel côté ?	Résection à gauche : vaccination du côté droit Résection à droite : vaccination du côté gauche Résection des deux côtés : vaccination dans le muscle antérolatéral de la cuisse
6.	Êtes-vous sous traitement anticoagulant ?	Comprimez pendant 2 min. pour éviter le saignement.
7.	Avez-vous d'autres questions ?	Informez sur : - les effets indésirables du vaccin (le paracétamol est autorisé mais pas en prévention !); - expliquez le temps d'attente de 15 minutes.

Influenza enfants < 9 ans et primovaccination => 2^{ème} dose après au moins 4 semaines.

